



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Κανονική εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Ι 7 Φεβρουαρίου 2004

Διδάσκοντες: Α. Απέκης, Ρ. Βλαστού, Κ. Χριστοδουλίδης

Διάρκεια εξέτασης: 2,5 ώρες. Απαντήστε σε όλα τα θέματα. Τα θέματα είναι ισοδύναμα.

Θέμα 1. Μια σφαίρα με μάζα M κινείται οριζοντίως με ταχύτητα v_0 και προσκρούσει τη χρονική στιγμή $t=0$ σε ένα σακί με άμμο, πάχους d , το οποίο και διαπερνά. Η δύναμη τριβής μέσα στην άμμο είναι ανάλογη του τετραγώνου της ταχύτητας, $F = -kv^2$, όπου k είναι μια θετική σταθερά και το αρνητικό πρόσημο υποδηλώνει ότι η τριβή αντιτίθεται στην κίνηση. Η δύναμη της βαρύτητας μπορεί να αγνοηθεί. Να υπολογίσετε:

- Την ταχύτητα της σφαίρας ως συνάρτηση του χρόνου, $v(t)$.
- Την ταχύτητα της σφαίρας, $v(x)$, ως συνάρτηση της απόστασης x που έχει διανύσει μέσα στην άμμο, καθώς και την ταχύτητά της κατά την έξοδο από το σακί.
- Την απόσταση $x(t)$ που διανύει η σφαίρα μέσα στην άμμο ως συνάρτηση του χρόνου t .
- Τον χρόνο που απαιτείται για να περάσει η σφαίρα μέσα από το σακί.

Θέμα 2. Σωματίδιο με μάζα $m = 1$ kg κινείται πάνω στον άξονα των x . Η δυναμική ενέργεια του σώματος δίνεται από τη συνάρτηση: $U(x) = 2x(x-2)$ ($-\infty < x < +\infty$) σε μονάδες S.I..

- Σχεδιάστε τη συνάρτηση $U(x)$.
- Βρείτε τη δύναμη $F(x)$ που ασκείται στο σώμα, καθώς και το σημείο ισορροπίας και το είδος της ισορροπίας σε αυτό.
- Αποδείξτε ότι, αν το σωματίδιο μετατοπισθεί από τη θέση ισορροπίας του, θα εκτελέσει αρμονική ταλάντωση γύρω από αυτήν, με περίοδο ίση $T = \pi$.

Θέμα 3. Λεπτός ομογενής δίσκος με μάζα M και ακτίνα R μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα A που απέχει απόσταση $R/4$ από το κέντρο του, O , και είναι κάθετος στο επίπεδό του.

- Να υπολογιστεί η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς άξονα που περνά από το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδό του. Να αποδειχθεί ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα A είναι $I_A = \frac{9}{16}MR^2$.
- Να διατυπωθεί η εξίσωση κίνησης του δίσκου για ελεύθερη περιστροφή περί τον άξονα A , συναρτήσει της γωνίας θ που σχηματίζει ο άξονας AO με την κατακόρυφη κατεύθυνση. Να βρεθεί η γωνιακή συχνότητα ω_0 για μικρές περιστροφικές ταλαντώσεις του δίσκου περί τον άξονα A .

⇒⇒⇒

Θέμα 4. Ένα σωματίδιο μάζας ηρεμίας M κινείται στο σύστημα αναφοράς του Εργαστηρίου με ταχύτητα V . Το σωματίδιο διασπάται σε δύο άλλα, με μάζες ηρεμίας m και $2m$, αντίστοιχα. Τα δύο σωματίδια κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με το αρχικό σωματίδιο, με ταχύτητες $v_1 = \frac{4}{5}c$ και $v_2 = \frac{3}{5}c$, αντίστοιχα. Να βρείτε:

(α) Τον λόγο V/c και το μέγεθος Mc^2 σε GeV, αν δοθεί ότι $mc^2 = 1,31$ GeV.

(β) Τις ταχύτητες v'_1 και v'_2 των σωματιδίων με μάζες m και $2m$, αντίστοιχα, στο Σύστημα Μηδενικής Ορμής.

Γενικό Τυπολόγιο

$$\vec{L} = M \vec{r} \times \vec{v} \quad \vec{N} = \vec{r} \times \vec{F} \quad \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{N}$$

Σχετικιστική Κινηματική:

Αν ένα σύστημα αναφοράς S' κινείται με ταχύτητα V ως προς ένα σύστημα αναφοράς S , τότε:

$$x' = \gamma(x - Vt) \quad y' = y \quad z' = z \quad t' = \gamma\left(t - \frac{V}{c^2}x\right) \quad \beta \equiv \frac{V}{c} \quad \gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$\Delta l = \Delta l_0 / \gamma \quad \Delta t = \gamma \Delta t_0 \quad v'_x = \frac{v_x - V}{1 - \frac{v_x V}{c^2}}, \quad v'_y = \frac{v_y}{\gamma\left(1 - \frac{v_x V}{c^2}\right)}, \quad v'_z = \frac{v_z}{\gamma\left(1 - \frac{v_x V}{c^2}\right)}.$$

Σχετικιστική Δυναμική:

$$m_0 = m(0) \quad p = \gamma m_0 v \quad E = \gamma m_0 c^2 \quad m = m(v) = \gamma m_0 \quad E^2 = m_0^2 c^4 + p^2 c^2$$

Μετασηματισμός ορμής-ενέργειας:

$$p'_x = \gamma\left(p_x - \frac{\beta E}{c}\right) \quad p'_y = p_y \quad p'_z = p_z \quad E' = \gamma(E - c\beta p_x)$$

Για φωτόνια: $E = pc$