

## Κβαντομηχανική II, ΣΕΜΦΕ

### Τρίτη Σειρά Ασκήσεων

#### Ασκηση 1.

Υπολογίστε την πυκνότητα πιθανότητας στον χώρο των ορμών για έναν ταλαντωτή στην πρώτη διεγερμένη στάθμη.

Ποιά είναι η πιθανότητα να βρεθεί ο ταλαντωτής να έχει ορμή στην κλασικά απαγορευμένη περιοχή για αυτήν την ενέργεια;

#### Ασκηση 2.

Να υπολογίσετε την αναμενόμενη τιμή του τελεστή  $(xp_x + p_xx)^2$  ως προς την κυματοσυνάρτηση  $\Psi_n, n > 2$ , ενός αρμονικού ταλαντωτή.

#### Ασκηση 3.

$\alpha^\dagger$  και  $\alpha$  είναι οι τελεστές δημιουργίας και καταστροφής για έναν μονοδιάστατο αρμονικό ταλαντωτή. Χρησιμοποιώντας τον ορισμό των  $\alpha$  και  $\alpha^\dagger$ , και τις ιδιότητες  $\alpha^\dagger \Psi_n = \sqrt{n+1} \Psi_{n+1}$ ,  $\alpha \Psi_n = \sqrt{n} \Psi_{n-1}$  όπου οι  $\Psi_n$  είναι ιδιουσναρτήσεις του ταλαντωτή.

α) Δείξτε ότι

$$x\Psi_n = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\sqrt{n}\Psi_{n-1} + \sqrt{n+1}\Psi_{n+1})$$
$$\frac{d\Psi_n}{dx} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} (\sqrt{n}\Psi_{n-1} - \sqrt{n+1}\Psi_{n+1})$$

β) Υπολογίστε τις μέσες τιμές  $\langle n|x^2|n\rangle$  και  $\langle n|P^2|n\rangle$  καθώς και το γινόμενο αβεβαιότητας  $(\Delta x)(\Delta P)$ .

γ) Γράψτε τους πίνακες  $x_{nm}$ ,  $P_{nm}$  και  $N_{nm}$ , όπου  $N$  είναι ο τελεστής αριθμού κβάντων (αριθμησης).

#### Ασκηση 4.

α) Κάθε γινόμενο τελεστών  $\alpha^\dagger$  και  $\alpha$ , με το ίδιο πλήθος τελεστών δημιουργίας και καταστροφής, είναι μια συνάρτηση του τελεστή αριθμησης  $\hat{N}$ , όπου  $\hat{N} = \alpha^\dagger \alpha$ .

β) Δείξτε ότι  $a^n (\alpha^\dagger)^n = (\hat{N} + 1)(\hat{N} + 2) \cdots (\hat{N} + n)$  και  $(\alpha^\dagger)^n a^n = \hat{N}(\hat{N} - 1) \cdots (\hat{N} - n + 1)$ .

#### Ασκηση 5.

Βρείτε τις ιδιοτιμές και τις ιδιουσναρτήσεις των δέσμων καταστάσεων για ένα απειρόβαθο πηγάδι δυναμικού με ένα πρόσθετο δέλτα πηγάδι δυναμικού στο κέντρο του.

### Άσκηση 6.

Να υπολογιστούν οι ενέργεις των δέσμιων καταστάσεων για την μονοδιάστατη δυναμική ενέργεια  $V(x) = -\frac{g}{x}$ .

Η δυναμική ενέργεια ορίζεται για  $x > 0$  με τον περιορισμό  $\Psi(0) = 0$ ,  $g > 0$ .

### Άσκηση 7.

Η δυναμική ενέργεια ενός σωματιδίου μάζας  $m$ , σε μία διάσταση, δίνεται από την σχέση

$$V(x) = \begin{cases} +\infty, & x < 0 \wedge x > \alpha \\ 0, & 0 \leq x < \beta \wedge \gamma < x \leq \alpha \\ V_0, & \beta \leq x \leq \gamma \end{cases}$$

Θεωρώντας το  $V_0$  σαν διαταραχή να υπολογίσετε τις ενέργειες  $W_n$  και τις κυματοσυναρτήσεις  $\Phi_n$  του σωματιδίου σε πρώτη τάξη της θεωρίας διαταραχών.

### Άσκηση 8.

Σωματίδιο μάζας  $m$ , στην μια διάσταση, έχει δυναμική ενέργεια  $V(x) = V_0 e^{\lambda x^2}$  με  $\lambda > 0$ . Υπολογίστε προσεγγιστικά την θεμελιώδη και την πρώτη διεγερμένη στάθμη.

### Άσκηση 9.

Η Χαμιλτονιανή ενός σωματιδίου μάζας  $m$  στο επίπεδο  $(x, y)$  δίνεται από την σχέση

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left( \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) + \frac{1}{2} m \omega^2 (x^2 + y^2) + cxy$$

Όπου  $c$  είναι μια σταθερά.

- α) Να υπολογιστούν οι ενέργειες και οι κυματοσυναρτήσεις του σωματιδίου για  $c = 0$ .
- β) Εάν  $c \neq 0$  και  $c \ll m\omega^2$ , να υπολογιστούν σε πρώτη τάξη της θεωρίας των διαταραχών οι ενέργειες της χαμηλότερης εκφυλισμένης στάθμης του πρώτου ερωτήματος.
- γ) Να υπολογίσετε ακριβώς τις ενέργειες και τις κυματοσυναρτήσεις του συστήματος για κάθε  $c \leq m\omega^2$ .

Υπόδειξη, να ορίσετε δυο νέες μεταβλητές, τις  $x = v + z$  και  $y = v - z$ .

### Άσκηση 10.

Την χρονική στιγμή  $t = 0$ , ένα χραντομηχανικό σύστημα είναι σε μια κατάσταση  $\Psi_1^{(0)}$ , η οποία ανήκει σε μια διπλά εκφυλισμένη στάθμη. Να οριστεί η πιθανότητα να βρεθεί το σύστημα στην κατάσταση  $\Psi_2^{(0)}$  με την ίδια αδιατάραχτη ενέργεια κάποια χρονική στιγμή  $t \neq 0$ . Η μετάβαση οφείλεται στην δράση μιας διαταραχής  $V(x)$  χρονικά σταθερής.

**Άσκηση 11.**

Φορτισμένος αρμονικός ταλαντωτής στην κατάσταση  $\Psi_n$  αλληλεπιδρά με ένα περαστικό ομογενές ηλεκτρικό πεδίο της μορφής

$$\vec{\mathcal{E}}(t) = \vec{\mathcal{E}}_0 e^{-\lambda t^2}, \lambda > 0, \vec{\mathcal{E}}_0 = \mathcal{E}_0 \hat{x}$$

Βρείτε το πλάτος μετάβασης στην κατάσταση  $\Psi_m$ .

**Άσκηση 12.**

Ένα ομαλό ηλεκτρικό πεδίο δρά ξαφνικά σε έναν φορτισμένο αρμονικό ταλαντωτή στην ψεμελιώδη κατάσταση. Να ορίσετε την πιθανότητα μετάβασης του ταλαντωτή στις διεγερμένες καταστάσεις.