

Οπότε παίρνουμε

$$\sigma(e^-e^+ \rightarrow \mu^-\mu^+) = \frac{4\pi\alpha^2}{3s}$$

Διατήρηση της ελκικότητας σε μεγάλες ενέργειες

Έχουμε ήδη δει ότι για $E \gg m$ ισχύει

$$P_L u = \frac{1}{2}(1 - \gamma^5)u \equiv u_L \quad \text{με αρνητική ελκικότητα } \lambda = -1/2$$

$$P_R u = \frac{1}{2}(1 + \gamma^5)u \equiv u_R \quad \text{με θετική ελκικότητα } \lambda = +1/2$$

Ας το δούμε αυτό καλύτερα πηγαίνοντας στην γνωστή μορφή των

λύσεων του Dirac για θετικές ενέργειες

$$u^{(1,2)} = \begin{pmatrix} \chi^{(s)} \\ \frac{\sigma \cdot \mathbf{p}}{E+m} \chi^{(s)} \end{pmatrix} \quad \chi^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad \chi^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Γνωρίζουμε ότι αυτή η επιλογή του $\chi^{(s)}$ αντιστοιχεί στην ορμή $(0, 0, p)$ και ότι το $u^{(1)}$ έχει θετική ελκτικότητα ($\lambda = +1/2$), ενώ το $u^{(2)}$ έχει αρνητική ελκτικότητα ($\lambda = -1/2$).

$$\begin{pmatrix} \sigma \cdot \hat{\mathbf{p}} & 0 \\ 0 & \sigma \cdot \hat{\mathbf{p}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \chi^{(s)} \\ \frac{\sigma \cdot \mathbf{p}}{E+m} \chi^{(s)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_3 \chi^{(s)} \\ \frac{p}{E+m} \chi^{(s)} \end{pmatrix} = \pm \begin{pmatrix} \chi^{(s)} \\ \frac{\sigma_3 p}{E+m} \chi^{(s)} \end{pmatrix}$$

μιας και $\sigma_3 \chi^{(1)} = \chi^{(1)}$ και $\sigma_3 \chi^{(2)} = -\chi^{(2)}$ Όμοια, το

$u^{(3)}(-\mathbf{p}) = v^{(2)}(\mathbf{p})$ έχει θετική ελκτικότητα ($\lambda = +1/2$), ενώ το

$u^{(4)}(-\mathbf{p}) = v^{(1)}(\mathbf{p})$ έχει αρνητική ελκτικότητα ($\lambda = -1/2$).

Για υψηλές ενέργειες, $E + m \sim E$ και $\frac{\sigma \cdot \mathbf{p}}{E+m} \sim \frac{\sigma \cdot \mathbf{p}}{E} = \frac{\sigma_3 p}{E} = \sigma_3$.
 Και τα $u^{(1,2)}$ γίνονται

$$u^{(1)} = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \sigma_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}, \quad \text{και} \quad u^{(2)} = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \sigma_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

Όμοια, οι αρνητικής ενέργειας λύσεις

$$u^{(3,4)}(\mathbf{p}) = \begin{pmatrix} -\frac{\sigma \cdot \mathbf{p}}{|E|+m} \chi^{(s)} \\ \chi^{(s)} \end{pmatrix} \quad \text{ή} \quad u^{(3,4)}(-\mathbf{p}) = \begin{pmatrix} \frac{\sigma \cdot \mathbf{p}}{|E|+m} \chi^{(s)} \\ \chi^{(s)} \end{pmatrix}$$

γράφονται

$$u^{(3)}(-\mathbf{p}) = \left(\sigma_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right), \quad \text{και} \quad u^{(4)}(-\mathbf{p}) = \left(\sigma_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Είχαμε, επίσης, δει ότι για υψηλές ενέργειες ο τελεστής της ελκυστικότητας $\Sigma \cdot \hat{\mathbf{p}}$ και ο τελεστής της χειραλωκότητας γ^5 έχουν την

ίδια δράση: $\gamma^5 \sim \Sigma \cdot \hat{\mathbf{p}}$, δηλαδή $\gamma^5 = \text{diag}(\sigma_3, \sigma_3)$. Οπότε

$$P_L = \frac{1}{2}(1 + \gamma^5) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + \sigma_3 & 0 \\ 0 & 1 + \sigma_3 \end{pmatrix}$$
$$P_R = \frac{1}{2}(1 - \gamma^5) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 - \sigma_3 & 0 \\ 0 & 1 - \sigma_3 \end{pmatrix}$$

Η δράση του $\frac{1}{2}(1 \pm \sigma_3)$ στα $\chi^{(s)}$ είναι

$$\frac{1}{2}(1 + \sigma_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \frac{1}{2}(1 - \sigma_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$\frac{1}{2}(1 + \sigma_3) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0, \quad \frac{1}{2}(1 - \sigma_3) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Οπότε

$$P_{Ru}^{(1)} = \frac{1}{2}(1 + \gamma^5)u^{(1)} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + \sigma_3 & 0 \\ 0 & 1 + \sigma_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \sigma_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \sigma_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = u^{(1)}$$

ενώ $P_R u^{(2)} = 0$. Άρα, το P_R προβάλει το $u^{(1)}$, που έχει θετική ελικτικότητα ($\lambda = +1/2$). Όμοια, ο P_L προβάλει το $u^{(2)}$ που έχει αρνητική ελικτικότητα ($\lambda = -1/2$). Αν εφαρμόσουμε τους P_{LR} στους $u^{(3,4)}(-\mathbf{p})$, θα δούμε ότι $P_R u^{(3)}(-\mathbf{p}) = u^{(3)}(-\mathbf{p})$, $P_L u^{(3)}(-\mathbf{p}) = 0$, $P_L u^{(4)}(-\mathbf{p}) = u^{(4)}(-\mathbf{p})$ και $P_R u^{(4)}(-\mathbf{p}) = 0$. Επομένως, το $u^{(3)}(-\mathbf{p})$ είναι R και το $u^{(4)}(-\mathbf{p})$ είναι L . Αλλά, αυτά αντιστοιχούν σε “έλλειψη” ηλεκτρονίου με $-\mathbf{p}$, άρα το αντίστοιχο ποζιτρόνιο έχει αντίθετη χειραλικότητα: το

$v^{(2)}(\mathbf{p}) = u^{(3)}(-\mathbf{p})$ είναι L και το $v^{(1)}(\mathbf{p}) = u^{(4)}(-\mathbf{p})$ είναι R .

Συνοψίζουμε:

Σε μεγάλες ενέργειες

το $u^{(1)}(\mathbf{p})$ έχει $\lambda = +1/2$ και είναι R ,

το $u^{(2)}(\mathbf{p})$ έχει $\lambda = -1/2$ και είναι L ,

το $v^{(2)}(\mathbf{p})$, έχει $\lambda = +1/2$ και είναι L ,


το $v^{(1)}(\mathbf{p})$, έχει $\lambda = -1/2$ και είναι R ,

Το πεδίο $\bar{u}\gamma^\mu u$ γράφεται

$$\begin{aligned}\bar{u}\gamma^\mu u &= \bar{u}(P_L + P_R)\gamma^\mu(P_L + P_R)u = \bar{u}P_L\gamma^\mu P_R u + \bar{u}P_R\gamma^\mu P_L u = \\ &= u^\dagger\gamma^0 P_L\gamma^\mu u_R + u^\dagger\gamma^0 P_R\gamma^\mu u_L = u^\dagger P_R\gamma^0\gamma^\mu u_R + u^\dagger P_L\gamma^0\gamma^\mu u_L =\end{aligned}$$

$$= (P_R u)^\dagger \gamma^0 \gamma^\mu u_R + (P_L u)^\dagger \gamma^0 \gamma^\mu u_L = \bar{u}_R \gamma^\mu u_R + \bar{u}_L \gamma^\mu u_L$$

διότι $P_L P_R = P_R P_L = 0$, $\gamma^{5^2} = 1$, $\gamma^\mu \gamma^5 = -\gamma^5 \gamma^\mu$. Επομένως, παρατηρούμε ότι η ηλεκτροδυναμική, για μεγάλες ενέργειες, $E \gg m$, διατηρεί την ελικτικότητα. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που έχουμε ψευδοδιάνυσμα ($\gamma^\mu \gamma^5$) αντί διάνυσμα (γ^μ) στην αλληλεπίδραση.



Στην εξάλωση και την δίδυμη γένεση, το ηλεκτρόνιο και το ποζιτρόνιο έχουν αντίθετη χειραλικότητα (και επομένως, σε

μεγάλες ενέργειες αντίθετη ελκτικότητα).

$$\overline{u^{(3,4)}(-\mathbf{p})} P_R \gamma^\mu P_L u^{(1,2)} =$$


$$u^{(3,4)}(-\mathbf{p})^\dagger \gamma^0 P_R \gamma^\mu u_L^{(2)} = (P_L u^{(3,4)}(-\mathbf{p}))^\dagger \gamma^0 \gamma^\mu u_L^{(2)} =$$

$$\left(u_L^{(4)}(-\mathbf{p}) \right)^\dagger \gamma^0 \gamma^\mu u_L^{(2)} = \left(v_R^{(1)}(\mathbf{p}) \right)^\dagger \gamma^0 \gamma^\mu u_L^{(2)} = \overline{v_R^{(1)}(\mathbf{p})} \gamma^\mu u_L^{(2)}$$

και όμοια

$$\overline{u^{(3,4)}(-\mathbf{p})} P_L \gamma^\mu P_R u^{(1,2)} = \overline{v_L^{(2)}(\mathbf{p})} \gamma^\mu u_R^{(1)}$$

Αντίστοιχα ισχύει και για την δίδυμη γένεση.



Άσκηση 30 Δείξτε ότι στην διάσπαση $\mu^- \rightarrow e^- \nu_\mu \bar{\nu}_e$ το e είναι

L . Στην $\mu^+ \rightarrow e^+ \bar{\nu}_\mu \nu_e$, ποια είναι η χειραλικότητα του e ;

Μπορούμε μόνο με την διατήρηση της στροφορμής να

υπολογίσουμε το αναλλοίωτο πλάτος για την $e^+ e^- \rightarrow \mu^+ \mu^-$.

Όπως είδαμε, το ηλεκτρόνιο και το ποζιτρόνιο (στην αρχική κατάσταση) όπως και το μιονίο και το αντιμιονίο (στη τελική κατάσταση) θα πρέπει να έχουν αντίθετη ελικτικότητα. Επομένως, στο Κέντρο Μάζας, θα έχουμε τις τέσσερις παρακάτω περιπτώσεις, όπου με παχιά βέλη δείχνουμε το spin και σημειώνεται και η αντίστοιχη ελικτικότητα.